

# Inhalt



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

## **Grundlagen Lebensmittelrecht**

- Gesetzliche Grundlagen (Hygiene, Fleischkontrolle, Rückverfolgbarkeit)

## **Wildbrethygiene**

- Anatomie und Schusslagen
- 12 kritische Punkte

## **Wildtierkrankheiten**

- Krankheit und Ursachen
- Infektionskrankheiten/Seuchen
- Auffälligkeiten
- Ausgewählte Krankheiten (viral, bakteriell, parasitär)



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

# Gesetzliche Grundlagen



# Geltungsbereich

- Für Jagdwild gelten grundsätzlich die gleichen Hygienevorschriften wie für Schlachtvieh.
- Aber: nur wenn die Jägerin oder der Jäger das Wildbret an Dritte abgibt, so sind die geltenden gesetzlichen Hygienevorschriften einzuhalten.
- Ausgenommen ist demnach die private häusliche Verwendung (Art. 1 Abs. 2 VSFK).
- Eine Besonderheit besteht bei der Abgabe an Wildbearbeitungsbetriebe.



# Private häusliche Verwendung (Eigengebrauch)

- Im Eigengebrauch gelten die Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung nicht.
- Eigengebrauch ist, wenn das Fleisch im Haushalt der beteiligten, jagdberechtigten Person bleibt (unter demselben Dach). Erfolgt z.B. die Zerlegung in einer Metzgerei, gelten jedoch die Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung.
- Jede Abgabe (auch kostenlos) an Dritte ist **kein** Eigengebrauch mehr.

# Untersuchung

## (Anhang 14 VHyS)



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

Eine fachkundige Person hat zudem zu bescheinigen, dass:

- der Tierkörper und die Eingeweide keine Merkmale gezeigt haben, die darauf schliessen lassen würden, dass das Fleisch für die menschliche Gesundheit bedenklich sein oder
- der Tierkörper Auffälligkeiten aufweist und deshalb vor einer allfälligen Abgabe als Lebensmittel einer amtlichen Fleischuntersuchung zuzuführen ist.

# Fachkundige Person

(Art. 21 VSFK)



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

Jede Jägerin und jeder Jäger gilt als fachkundige Person im Sinne der Lebensmittelgesetzgebung und trägt damit die Verantwortung für das Lebensmittel Wildbret. Damit kann die Erlegerin oder der Erleger auch als fachkundige Person das Wildbret überprüfen (wenn keine Auffälligkeiten bemerkt wurden).



# Amtliche Fleischuntersuchung (Art. 20 VSFK)

Eine Fleischuntersuchung durch die amtliche Tierärztin (ATA) oder den amtlichen Tierarzt ist obligatorisch bei

- auffälligen Veränderungen, Abweichung vom Normalfall am Wildtierkörper und/oder
- sofern das Jagdwild nicht direkt an Konsumentinnen und Konsumenten oder an Einzelhandelsbetriebe abgegeben wird (z.B. Export oder Grosshandel).

Wildbret in kleinen Schlachtbetrieben: der ATA kann sämtliches der Schlachtung zugeführte Jagdwild und die dazugehörigen Bescheinigungen kontrollieren.



Jedes Stück Wild, welches in Verkehr gebracht wird (auch verschenken) ist auf Genusstauglichkeit zu untersuchen.

**Dies zählt zu der Sorgfaltspflicht des Jägers (Strafrecht).**

**Gilt nicht für die private häusliche Verwendung.**

 Appenzell Ausserrhoden

 KANTON  
APPENZELL INNERRHODEN

**Bescheinigung für die Abgabe von Jagdwild als Lebensmittel**  
(gemäss Anhang 14 VHyG)

Marken – Nummer (Kennzeichnung): .....

**Erlegeprotokoll**

Name, Adresse Erleger/In: .....

Telefon (Natel): .....

Tierart: .....

Der/die Erleger/In bestätigt, dass:

- vor dem Erlegen beim oben bezeichneten Tier keine Verhaltensstörungen beobachtet worden sind
- kein Verdacht auf Umweltkontamination besteht; und
- der Jagdverlauf keine für die Lebensmittelsicherheit relevanten Gefahren mit sich gebracht hat.

Ort: ..... Datum: ..... Unterschrift Erleger/In: .....

**Bescheinigung über die Untersuchung**

Die fachkundige Person bestätigt, dass:



© Tobias Obwegeser



# Wildbrethygiene




Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

# Anatomie und Schusslagen



# Der gute Schuss steht am Anfang

- Wildbrethygiene beginnt mit sauberem Ansprechen und dem rasch tödlichen und professioneller Schuss.
- Die Jägerin oder der Jäger muss sich der Trefferlage und Wirkung des Schusses bewusst sein, bevor der Abzug betätigt wird.
- Dies bedingt gute Kenntnisse der Anatomie des Wildes sowie der Ballistik.



Bildquelle: AJF



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

## Resultat Blattschuss



# Weidwundschuss-Konsequenzen

- Werden Därme oder Pansen infolge des Schusses (oder auch unsachgemässer Schlachtprozesse) verletzt, wird ein Teil des Wildkörpers kontaminiert.
- Nun gilt es «saubere» Organe und Körperteile zu schützen und kontaminiertes Wildbret grosszügig zu entfernen.
- Weidwundschüsse beeinträchtigen die Qualität des Wildbrets auf jeden Fall.



Weidwundschuss  
und anschliessend  
schlechte Bearbeitung



# Wirkung des Kugelschusses

- Beim Kugelschuss ist die optimale Trefferlage seitlich quer durch die Brusthöhle (Kammer-/Blattschuss) und führt zur Zerstörung von Herz und Lunge. Ein- und Ausschuss müssen vor Zwerchfell liegen.
- Vorsicht: Steht das Tier nicht «breit», kann trotz guter Einschusslage der Magen-Darm-Trakt getroffen werden, mit entsprechenden Konsequenzen (vgl. «Weidwundschuss»).




# Wirkung des Schrotschusses

- Beim Schrotschuss werden möglichst zahlreiche Treffer (beim Schalenwild im Herz- und Lungenbereich) angestrebt, die einen raschen Schocktod bewirken.
- Ein guter Schrotschuss zerstört zudem lebenswichtige Organe im Kammerbereich.
- Schlechte Schrotschüsse (v.a. Weidwundschüsse) können zu grossflächiger Kontamination führen und ein mögliches Leiden des Tieres.

# Linke Körperseite



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger




Bildquelle: AJF

# Rechte Körperseite



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger



Zwerchfell

Leber

Magen-Darmtrakt

Herz

Bildquelle: AJF

# Wildbrethygiene



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger



Quelle: Buch «Jagen in der Schweiz», Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz der Schweiz, Abb. 7.1



# Wildbrethygiene – Kontrollpunkte


## Genusstauglichkeit ist von vielen Faktoren abhängig:

- Jagdmethode, Schusslage
- Dauer bis Aufbrechen
- Tiergesundheit (vor und nach Schuss, Zeichen Anomalien?)
- Sauberkeit Aufbrechen / Transport
- Zeit und Temperatur bis zur Kühlung
- Enthäuten / Weiterverarbeitung





# 1. Todesursache / Eintreten des Todes



Säuregehalt im Fleisch bis 24 Stunden nach Eintreten des Todes.

PSE und DFD bezeichnen «Fleischfehler», dh. das Fleisch weist geringere Qualität auf.

Quelle:

[https://www.3trois3.com/articles/relation-entre-methodes-detourdissement-et-qualite-de-la-viande-i\\_713/](https://www.3trois3.com/articles/relation-entre-methodes-detourdissement-et-qualite-de-la-viande-i_713/)

## Tod der Tiere:

- So schnell wie möglich
- Fachgerecht
- Ohne unnötigen Stress

## Nach dem Tod:


- Säuregehalt des Fleisches erhöht (pH-Wert sinkt)
- Säuregehalt erlaubt dem Fleisch auszutrocknen / zu «reifen» → saures Milieu + Wasserverlust
  - Fleisch ist besser haltbar
  - pH-Senkung (Säuerung) ist wichtig!
- Lüftung und Trocknung
- Kühlung



# Fleischreifung

## Erste Phase: anaerobe Glykolyse (Beginn Tod)

- **pH-Wert** im Fleisch **sinkt** von 7,2 auf 5,2–5,5
- Glykogen (Energiereserven) → Milchsäure
- **Totenstarre** (Ende der ATP-Energiereserven)



## Zweite Phase: Lösen der Totenstarre durch muskeleigene Enzyme

→ Zartheits- & Geschmacksbildung

- Einfluss der Jagd durch **prämortalen «Stress»** (Treibjagd, Nachsuche, etc.) -> pH-Wert sinkt nicht genügend!



# Weitere wichtige Aspekte, die beim Erlegen von Wild in der heutigen Zeit kritisch zu beachten sind:



- Verletzungen / Hetze / nicht sofortiger Tod → **Tierschutzgesetz**
- Weidwundschuss / Nachsuche / Unfallwild → **Lebensmittelgesetz (Konsumentenschutz)**
- Fallwild / Tiere mit Krankheitsanzeichen → **Tierseuchengesetz: Kadaver**

**Tiere, mit Anzeichen einer ansteckenden Krankheit (Tierseucheverdacht) sind meldepflichtig!**

# 2. Jagdmethode



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

- **Ansitzjagd oder Pirsch**

Ansprechen einfacher und genauer  
Schusslage meist gut, wenig Fehlschüsse

- **Bewegungsjagd**

Ansprechen schwieriger und ungenauer  
Höhere Gefahr von Fehl-  
/Weidwundschüssen

- **Such-/ Beizjagd**

Wenig verbreitet



Quelle: LSVW Fribourg



Quelle: [www.Dog-Control.de](http://www.Dog-Control.de)



# 3. Schusslage / Auswirkungen

## Jagdwaffen

- mit deren Handhabung der Jäger vertraut ist
- ausreichende Ausübung

## Munition

- Passendes **Kaliber** (je nach Tierart und Jagdmethode)
- Bleifreie Munition zu bevorzugen

## Schuss

- Ausreichende Kenntnisse der **Anatomie** → ideale Flugbahn der Kugel
- Kammerschuss ✓
- Pansenschuss (Weidwundschuss) ✗







Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger



© Tobias Obwegeser



Der dreidimensionale Wildkörper  
zeigt Schusskanäle in Abhängigkeit  
zur Trefferlage

Quelle: Buch «Jagen in der Schweiz»,  
Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz  
der Schweiz, Abb. 6.4



Quelle: LSVW Fribourg



Quelle: LSVW Fribourg


# 4. Nachsuche



Quelle: LSVW Fribourg

- Hauptziel primär: Jagdethik und Tierschutz
- Sekundär: noch verwertbares Wildbret
- Faktor Zeit entscheidend
- Verletzungen (Kontamination?)
- Falls Zweifel direkt an ATA (Amtlicher Tierarzt) melden





© Tobias Obwegeser

Bakterien-Wachstum:

Anzahl Bakterien, Temperatur, Feuchtigkeit,  
pH, Nahrung, Oberfläche, Zeit

Bakterien können  
verursachen:

Lebensmittel-Intoxikationen (Staphylokokken)  
Lebensmittel-Infektionen (Salmonellen,  
Campylobacter)

# Problematik Nachsuche / Unfallwild



Quelle: Internet

- Stress (verschlechterte Fleischqualität, hoher pH-Wert)
  - Blutvergiftung (Streuung von Bakterien über Blut in Muskulatur)
  - **Fallwild:**  
**Entsorgung** in Kadaversammelstelle (K1)
- 
- **Unfallwild:**
    - **tot** = Fallwild → Entsorgung
    - **lebend** → fachkundige Person bei **Veränderungen**  
→ **amtlicher Tierarzt**



# Verderb begünstigt durch:



© Tobias Obwegeser

## Hohe Ausgangskeimzahl

- Schlechter Schuss
- Unsauberes Ausweiden

## Schnelle Keimvermehrung

- Hohe Temperatur
- Guter Nährboden
- Hohe Feuchtigkeit
- Hoher pH-Wert
- Lange Nachsuche

**Stress**  
**Jagdmethode**  
**Krankheit**  
**Trefferlage**



# Stickige Reifung / «Verhitzen»

## Zeichen von stickiger Reifung:

- kupfer-braunrot schimmernde Oberflächen
- faulig-muffiger, saurer Geruch




© Hans Heeb



© Tobias Obwegeser

# 5. Aufbrechen



© Dr. Otmar Deflorin

## Aufbrechen:

- **Unverzüglich, sauber und sorgsam**  
= Zeit und Technik!

## Handschuhe:

- Schutz des Jägers vor Ansteckung
- Schutz des Fleisches von Kontamination durch Jäger



© Dr. Otmar Deflorin

# Aufbrechen

**Unsachgemässes Aufbrechen** bringt ebenfalls Verschmutzung und Qualitätseinbussen mit sich:

- Reinigen mit Trinkwasser 
- Reinigen mit Schwamm / Lappen 

→ **Kontaminationen grosszügig wegschneiden**  
**(Zurichten)**



Quelle: LSVW Fribourg



Quelle: LSVW Fribourg

# 6. Untersuchung



- Ziel: einen Wildkörper auf **Auffälligkeiten** zu untersuchen
- Voraussetzung : Normalzustand gut kennen
- Fachkundiger Jäger: kann Abweichungen bei Organen und beim Wildbret feststellen
- Bei Feststellung von Auffälligkeiten:  
**Amtlicher Tierarzt ATA**
- ATA braucht möglichst alle veränderten Organe und den Tierkörper

## Beurteilung:

- Genusstauglich
- nicht genusstauglich → als Kadaver entsorgen



# Untersuchung (aussen)

- **Konstitution** des Wildes: Auffälligkeiten (Abmagerung)
- **Äussere Merkmale** (Verletzungen, abnorme Gliedmassen, Wunden, struppiges / mattes Fell, Kotspuren, verklebte Lichter / Windfang)
- **Abnormales Verhalten** (mangelnde Scheu, Aggressivität, Taumeln, Lahmheiten, Festliegen, Schwierigkeiten beim Aufstehen, Kreisbewegungen)




© Tobias Obwegeser

Sie können **wichtige Hinweise** auf eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Tieres sein.

# Untersuchung (innen)



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger



Quelle: LSVW Fribourg

Falls Bedenken für die menschliche Gesundheit bestehen  
(Veränderung / **Verschmutzung**): → **amtliche Fleischkontrolle**



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

# Trichinenformular

# 7. Bergung



© Dr O. Deflorin



© Tobias Obwegeser



© Dr O. Deflorin

- Bergungsart  
(Rucksack / Tragwanne / Fahrzeug)
- Die Öffnung schützen, falls langer Transport im Bergegebiet
- Es ist darauf zu achten, dass die Körperöffnungen während der Überführung keinesfalls verschmutzt werden.
- Tiere nicht übereinander stapeln

→ **Passive Kühlung**  
(vermeiden eines «Verhitzens»)

# 8. Strecke legen



Bild LSVW FR



© Tobias Obwegeser

- Um Wildbret korrekt zu behandeln, wird auf das klassische Legen der Strecke am Ende des Tages verzichtet.
- Milde Temperaturen **verhindern eine passive Kühlung** der Wildkörper.
- Bodenkeime **können Körperhöhlen** von Wildkörper **verschmutzen**.
- Alternativen zum Streckelegen:
  - nur bei **tiefen** Temperaturen
  - auf **sauberem** Boden

# 9. Kühlung / Lagerung



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger



Quelle: LSVW Fribourg

- In sauberem, genügend grossen Kühlraum-/-zelle bei konstanter Temperatur (max. 7 °C)
- Hinreichendes «**Reifen**» (Wasserverlust) der Schlachtkörper durch **die Lüftung**
- Schlachttierkörper im Fell **nicht im selben Raum** gelagert werden wie solche ohne Fell



Quelle: Amt für WJF Kanton Solothurn



© Tobias Obwegeser

## Um ein Verderben des Fleisches zu vermeiden:

- Wildschweine, schwere Hirsche und Steinböcke: **am Hals öffnen**;
- grossen Wildschweinen: **die Schultern befreien**.
- Je nach Situation ist auch ein Schutz vor Fliegen notwendig, z.B. ein Insektennetz.
- Der Schlachtkörper wird **kopfüber aufgehängt**, sonst sammelt sich das Blut in den Keulen an, was eine Qualitätseinbusse zur Folge haben kann.



Quelle: LSVW Fribourg

# 10. Verarbeitung



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger



© Dr. Otmar Deflorin


## Wildlokal für Lebensmittelgewinnung

- Meldepflichtig (Kantonschemiker oder Kantonstierarzt)
- Bauliche Anforderungen:
  - **glatte** Oberflächen
  - **leicht** zu reinigen
  - **Handwasch**vorrichtung mit genügend Warm- und Kaltwasser, Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher
- Nur für Jagdwild, wenn keine Anomalie gefunden wurde (oder nach der amtlichen Fleischuntersuchung und der Freigabe durch den ATA)
- Wenn Anomalien gefunden wurden: der Wildtierkörper und die verfügbaren Organe müssen zu einer Wildbearbeitungsbetrieb transportiert werden → Fleischkontrolle durch den ATA

**Wildbearbeitungsbetriebe:**  
Bewilligungspflichtig (KT),  
Nur Schlachten von Jagdwild  
und/oder Gehegewild,  
nicht weiter zerlegt (< 1/6) und  
verarbeitet



- Selbst für den Eigengebrauch (private häusliche Verwendung) vertrauen heute viele Jäger ihr Wildbret dem kompetenten Berufsmann an.
- Gelernte Metzger können dafür garantieren, dass ein Wildkörper fachmännisch verarbeitet wird.



Quelle: Buch «Jagen in der Schweiz»,  
Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz der Schweiz, Abb. 7.3

© Kuhn Lukas, ZH

# 11. Abgabe / Verkauf



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

## Verkauf

- Nur qualitativ **einwandfreies** Wildbret
- hochwertig, natürlich und aus nachhaltiger Nutzung

## Rückverfolgbarkeit

- Kennzeichnung am Tier (Etikette, Marke, Plombe)
- Bescheinigung Wild bis zum Abnehmer





Direktabgabe an Konsumenten, oder an Metzger zum Ladenverkauf oder an Wirt ins Restaurant:

## **Der Tierkörper**

- Ist gekennzeichnet und damit bis zum Jäger/zur Jägerin rückverfolgbar
- Verfügt über eine Bescheinigung, dass eine fachkundige Person das Tier untersucht hat und die Anforderungen erfüllt für die Abgabe als Lebensmittel
- Zuordnung ist eindeutig



# 12. Aus- und Fortbildung



- Mit den kantonalen Jungjägerausbildungen (Module Gesetzgebung, Hygiene und Wildtierkrankheiten) wird ein Grundstein im Bereich der Wildbretverwertung gelegt
- In Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden (Veterinärdienst) soll dieses Grundwissen auch bei den Jagdausübenden in weiteren Kursen gefördert und stets neuen Erkenntnissen angepasst werden



Booklet «Wildbrethygiene und Organveränderungen beim Schalenwild» JFK und VSKT



## Wildbrethygiene und Organveränderungen beim Schalenwild

Die wichtigsten Punkte zur Wildbrethygiene und zu möglichen Organveränderungen beim Schalenwild

Quelle: <http://kreisjaegerschaft-gelsenkirchen.de/wp-content/uploads/2011/09/wie-werde-ich-jaeger.jpg>



# WILDBRET

## *für die Küche*





**ROTWILD**  
In der Küche wird das fette und aromatische Wildfleisch vom Rotwild besonders geschätzt. Es zeichnet sich durch seine kräftige rote/rötliche Färbung und durch seinen hohen Eisengehalt aus. Eisen ist u.a. für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich und wirkt die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers.

**REHWILD**  
Das reine Wildfleisch vom Rehwild zeichnet sich durch seinen insgesamt geringeren Fettgehalt und seinen besonders hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren (insbesondere an Omega-3-Fettsäuren) aus. Die Muskulatur ist besonders zart/weich mit einem sehr geringen Bindegewehrsanteil, was das Rehwildfleisch besonders leicht verdaulich macht.

**HALALI**  
Your Choice of Game

# Wildtierkrankheiten



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger



(c) 10.11\_Amt für Jagd und Fischerei Graubünden



FIWI Bern  
Fisch- und Wildtiermedizin Universität Bern



(c) 10.11\_Amt für Jagd und Fischerei Graubünden




(c) 10.19\_Vokery, Philipp

# Krankheit

Unter Krankheit versteht man eine Störung der normalen Funktion eines lebenden Körpers bzw. seiner Organe und Organsysteme.

→ Diese Funktionsstörungen können so schwerwiegend sein, dass der Tod eintritt.





# Mögliche Ursachen von Krankheiten



10.1

Quelle: Buch «Jagen in der Schweiz», Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz der Schweiz, Abb. 10.1



# Was muss / sollte der Jäger beachten?

- Einzeltier befallen (mehrere Tiere = Tierseuche)?
- Gefährlich für den Menschen (Zoonose)?
- Tierkörper verwertbar / Verkehrstauglich –  
amtliche Fleischuntersuchung notwendig?
- Meldepflicht?

# Infektionskrankheiten: Seuchen

Tierseuchen sind **Krankheiten**, welche von **Tier zu Tier übertragen** werden. Es gibt **hochansteckende Tierseuchen** (sehr infektiös), die die Wild- oder Nutz-/Haustierbestände und/oder die einheimische Bevölkerung ernsthaft gefährden und **erheblichen wirtschaftlichen Schaden** verursachen können.




## Beispiele:

- Schweinepest, Vogelgrippe
- Maul und Klauenseuche
- Gewisse Zoonosen wie Tuberkulose und Tollwut



# Entstehung von Infektions- Krankheiten: mehrere Faktoren



**Erreger:**  
Bakterien  
Viren  
Parasiten

**Stressfaktoren:**  
Hitze / Kälte  
Luftfeuchtigkeit und  
Luftgeschwindigkeit  
Nachsuche



# Infektionskrankheiten: Zoonosen



Zoonosen sind ansteckende Krankheiten, die **zwischen Mensch und Tier übertragbar** sind.



## Beispiele:

- Tollwut / Lippengrind
- Tuberkulose
- Hasenpest (Tularämie)
- Fuchsbandwurm / Trichinen / Räude




Quelle: AJF GR

**Zoonosen sind meldepflichtig!**

# Übertragungswege: Infektionskrankheiten



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger



Quelle: AJF GR




# Auffälligkeiten vor dem Schuss


Durch genaues Beobachten kann der Jäger anormales Verhalten und krankhafte Veränderungen von Wildtieren erkennen.



schwankend




schonender Vorderlauf



ohne Scheu



struppiges Fell



in Kreisen gehend

Quelle: Buch «Jagen in der Schweiz»,  
Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz der Schweiz, Abb. 10.4

**Falls ein Verkauf vorgesehen ist, ist der Tierkörper zwingend einer amtlichen Fleischuntersuchung zuzuführen!**



# Auffälligkeiten nach dem Schuss

Auf Veränderungen äusserlich am Tier, sowie im Brust- und Bauchhöhlenbereich (Organe) sollte gut geachtet werden.



Abnormer Maulbereich (Äser)



Quelle: FIWI Bern und AJF GR

Durchfallspuren

**Falls ein Verkauf vorgesehen ist, ist der Tierkörper zwingend einer amtlichen Fleischuntersuchung zuzuführen!**

# Aufbrechen



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

äusserlich + **innerlich** sichtbare Auffälligkeiten

Form


Farbe

Geruch

Beschaffenheit



Körperhöhlen,  
Organe und  
Muskulatur




Quelle: FIWI Bern



Abszess im Leistenbereich



Tuberkel am MDT: Tuberkulose




Lungenentzündung



Bandwurmfinne an Leber

Quelle: FIWI Bern  
und AJF GR

Falls ein Verkauf vorgesehen ist, ist der Tierkörper zwingend einer amtlichen Fleischuntersuchung zuzuführen!



10.14 Amt für Jagd und Fischerei Graubünden AJF

Leber mit Blasen auf der  
Oberfläche: Zysten / Tumor



(c) 10.11 Amt für Jagd und Fischerei Graubünden

Niere mit roten Punkten:  
afrikanische Schweinepest (ASP)



Helle Knoten auf der Leber: Abszess

Institut für Fisch- und Wildtiermedizin Universität Bern

Falls ein Verkauf vorgesehen ist, ist der Tierkörper zwingend einer  
amtlichen Fleischuntersuchung zuzuführen!



# Ausgewählte Krankheiten

## Virale Infektionskrankheiten:

- Klassische- / Afrikanische Schweinepest (KSP/ASP)
-  Tollwut / Vogelgrippe
- Staupe

## Bakterielle Infektionskrankheiten:

- Lungenentzündung
- Gamsblindheit
-  Tuberkulose
- Aktinomykose



# Ausgewählte Krankheiten

## Parasitäre Infektionskrankheiten:

-  Räude
-  Fuchsbandwurm (Echinococcose)
- Grosser und kleiner Leberegel
- Nasen- und Rachenbremsen



## Klassische und Afrikanische Schweinepest (KSP/ASP)

<b>Allgemeines</b>	Diese Viruserkrankung ist hochansteckend und kann grossen wirtschaftlichen Schaden verursachen.
<b>Von einer Ansteckung betroffen</b>	Schwarzwild und Hausschweine
<b>Übertragung/Verlauf</b>	Übertragung durch Kontakt mit infizierten Tieren oder Verfütterung von ungenügend erhitzten Fleischabfällen. Auch unsaubere (Jagd-) Kleidung und kontaminierte Gegenstände. Führt schnell zum Tod.
<b>Was kann man dagegen unternehmen?</b>	Schwarzwildpopulationen sind kurz zu halten. Kein Import von Fleisch/Trophäen aus Risikogebieten. Strikte Hygiene-regeln einhalten. Bekämpfung durch Staat/Kantone.
<b>Bemerkungen</b>	Auffälligkeiten wie dunkle Verfärbungen der Haut oder stecknadelgrosse punktförmige Blutungen auf Nieren, Kehlkopf oder Herz können auf die Seuche hinweisen. Genaue Untersuchung des Wildbrets und frühzeitige Meldung von Verdachtsfällen an den amtlichen Tierarzt.

## Klassische und Afrikanische Schweinepest (KSP/ASP)





Niere (oben links),  
Milz (oben rechts) und  
Därme mit ASP



Quelle: <https://www.chassenature.ch/apres-la-tuberculose-bovine-la- peste-porcine/>

## Klassische und afrikanische Schweinepest (KSP/ASP)



**ASP auf dem Vormarsch:** Situation in Tschechien, Polen, den baltischen Staaten, der Ukraine und Russland

(April 2018: 300 Km von der Schweiz)

Fälle in China (August 2018) und in **Belgien (September 2018) entdeckt**



## Klassische und Afrikanische Schweinepest (KSP/ASP)

Vorsichtsmassnahmen, um die Einschleppung dieser auch für Wildschweine hochansteckenden Krankheit in die Schweiz unter allen Umständen zu verhindern (BLV):

### DARAUF MÜSSEN SIE ACHTEN:

Für Reisende in / aus ASP-betroffenen Gebieten, insbesondere Tierhalter, Saisonarbeiter auf landwirtschaftlichen Betrieben und Fernfahrer, gelten die folgenden dringenden Hinweise:

- Bringen Sie keinen Reiseproviant (Fleisch- und Wurstwaren) aus den betroffenen Gebieten mit.
- Das Verfüttern von Küchenabfällen an Haus- und Wildschweine ist verboten.
- Entsorgen Sie generell Speiseabfälle in verschlossenen Müllbehältern.
- Bei Jagden in Ländern mit ASP befolgen Sie strikte Hygienemassnahmen (Reinigung der Jagdkleidung und Jagdgeräte). Verzichten Sie auf Jagdtrophäen.



Quelle: Grafiken BLV, Piktogramme Fotolia



# Tollwut



<b>Allgemeines</b>	Die Tollwut ist eine tödliche Infektionskrankheit, die Ende der 90er Jahre in der Schweiz erfolgreich bekämpft wurde. Weltweit kommt Tollwut v.a. in Afrika & Asien noch heute weitverbreitet vor. Auch in Osteuropa/Balkan auftretend
<b>Von einer Ansteckung betroffen</b>	Säugetiere, v.a. Fuchs.
<b>Übertragung/Verlauf</b>	Der Erreger (Virus) wird über den Speichel ausgeschieden und durch Biss infizierter Karnivoren verbreitet. Befallene Tiere zeigen Verhaltensänderungen und können aggressiv reagieren. Für betroffene Tiere und der Mensch endet die Krankheit tödlich.
<b>Was kann man dagegen unternehmen?</b>	Intensive Fuchsbejagung und Impfung von Füchsen (Köder) und von Nutz- und Heimtieren kann eine erneute Ausbreitung dieser Seuche massgeblich hemmen.
<b>Bemerkungen</b>	Die Schweiz gilt offiziell als tollwutfrei. Tier (Ausland Hund) und Mensch können geimpft werden. Meldung von Verdachtsfällen an Wildhut / den amtlichen Tierarzt.



# Staupe



<b>Allgemeines</b>	Seuchenzügen können Fuchs- und Dachsbestände drastisch reduzieren.
<b>Von einer Ansteckung betroffen</b>	Vor allem bei Fuchs und Dachs, aber auch Marder, Hund, Katze und anderen Fleischfressern.
<b>Übertragung/Verlauf</b>	Eine Erkrankung mit dem Staupevirus erfolgt durch direkten Kontakt oder mit Körperflüssigkeiten. Der Krankheitsverlauf ist sehr unterschiedlich (Verhaltensänderungen, allgemeine Schwäche, Nasen- und Augenausfluss, Husten) und kann zum Tod führen.
<b>Was kann man dagegen unternehmen?</b>	Wildbestand (Fuchs und Dachs) tief halten und Heimtiere (Hund) impfen. Verdachtsfälle der Wildhut melden. Füchse und Dachse sind keine konsumierbaren Arten.

# Lungenentzündung



<b>Allgemeines</b>	Lungenentzündungen werden v.a. durch Viren, Bakterien verursacht und können tödlich sein.
<b>Von einer Ansteckung betroffen</b>	Alle Tierarten
<b>Übertragung/Verlauf</b>	Sehr unterschiedlich, z.B. Erkrankung schwacher Einzeltiere oder vermehrtes Auftreten in einem ganzen Bestand.
<b>Was kann man dagegen unternehmen?</b>	Bejagung anpassen. Überhöhte Bestände und schlechter allgemeiner Gesundheitszustand begünstigen die Ausbreitung dieser Krankheit.
<b>Bemerkungen</b>	Erlegte Tiere mit Lungenveränderungen werden zusammen mit dem Organ vor der Verwertung einer Fachperson zur Beurteilung vorgelegt.

## Lungenentzündung



Lungen mit dunkelrot-fleischigen Bereichen (Entzündung) und schussbedingten Blutungen.


## Gamsblindheit



<b>Allgemeines</b>	Die Gamsblindheit ist eine hoch ansteckende Augenerkrankung, welche von Schafen auf Gämsen und Steinböcke übertragen wird.
<b>Von einer Ansteckung betroffen</b>	Gams- und Steinwild (teilweise tödlicher Verlauf) Schafe und Ziegen (kein tödlicher Verlauf).
<b>Übertragung/Verlauf</b>	Der Erreger wird über das Augensekret ausgeschieden. Die Übertragung erfolgt durch direkten oder indirekten Kontakt; auch durch Fliegen. Trübung des Auges, eitrige Verklebungen in der Augenumgebung.
<b>Was kann man dagegen unternehmen?</b>	Die erblindeten Tiere dürfen nicht gestört werden. Abschüsse nur bei Tieren mit ausgeflossenen Augen (keine Heilung mehr möglich). Keine infizierten Schafe alpen!!
<b>Bemerkungen</b>	Ein leichtgradiger Befall kann ausheilen, ein starker Befall führt zu Erblindung und damit zum Tod des Tieres (meist durch Absturz). Verdachtsfälle der Wildhut melden.

## Gamsblindheit

Krankheit kann von Tieren nicht auf den Mensch übertragen werden. Ist aber unter den Tieren hoch ansteckend!



Quelle: AJF GR



# Tuberkulose


<b>Allgemeines</b>	Die Tbc ist eine meldepflichtige Tierseuche, die auch auf den Menschen übertragen werden kann (Zoonose). Der Erreger kann monatelang in der Umwelt überleben.
<b>Von einer Ansteckung betroffen</b>	Säugetiere und Vögel, v.a. Rothirsch, Wildschwein, Dachs, Rind.
<b>Übertragung/Verlauf</b>	Der Erreger wird mit Ausscheidungen (Speichel, Kot) an die Umwelt abgegeben und durch die Äsung auf andere Tiere übertragen. Anzeichen am lebenden Tier sind selten (evt. Abmagerung). Beim Aufbrechen können vergrösserte, z.T. verkalkte Lymphknoten, kleine weissliche Knoten (Abszesse) an inneren Organen erkennbar sein.
<b>Was kann man dagegen unternehmen?</b>	Je nach Seuchenlage wird durch den Kantonstierarzt in Z' Arbeit mit der Jagdverwaltung Bekämpfungsmassnahmen getroffen. Genaue Untersuchung des Wildbrets und frühzeitige Meldung von Verdachtsfällen an den amtlichen Tierarzt.



## Tuberkulose



Quelle: LSVW Freiburg



Quelle: FIWI Bern  
und AJF GR

## Aktinomykose



<b>Allgemeines</b>	Der aufmerksame Beobachter kann die z.T. imposanten Schwellungen des Unterkiefers gut erkennen.
<b>Von einer Ansteckung betroffen</b>	v.a. beim Rehwild; bei anderen Tieren eher selten
<b>Übertragung/ Verlauf</b>	Der Erreger dringt bei Verletzungen, z.B. beim Zahnwechsel, in die Schleimhäute ein und verursacht eine schwerwiegende Veränderung des Kieferknochens. Dadurch entstehen Probleme beim Äsen und Wiederkäuen.
<b>Was kann man dagegen unternehmen?</b>	Das Wild sollte nach Absprache mit den zuständigen Behörden aus Tierschutzgründen erlegt werden.
<b>Bemerkungen</b>	Früher auch als „Strahlenpilz“ bezeichnet. Einzeltierenerkrankung, nicht ansteckend.





# Räude (in der CH v.a. Fuchsräude)

<b>Allgemeines</b>	Massive Veränderung der Haut und grossflächiger Fellverlust. Betroffene Tiere leiden unter starkem Juckreiz. Hochgradiger Räudebefall führt meistens zum Tod.
<b>Von einer Ansteckung betroffen</b>	Häufig bei Füchsen (Fuchsräude). Bei Gams- und Steinwild (Gamsräude) sehr gefürchtet.
<b>Übertragung/Verlauf</b>	Grabmilben leben in der Oberhaut, wo sie Bohrgänge anlegen, in denen die Eiablage erfolgt.
<b>Was kann man dagegen unternehmen?</b>	Die Räude ist eine hochansteckende Krankheit, die zu grossen Verlusten bei den betroffenen Wildtierarten führen kann. Behandlungsmöglichkeiten gibt es kaum. Wild mit starkem Räudebefall muss erlegt und korrekt entsorgt werden.
<b>Bemerkungen</b>	Den direkten Kontakt mit befallenen Tieren möglichst vermeiden! Infizierte Hunde können vom Tierarzt behandelt werden. Meldung an die Wildhut.



Parasitäre Infektionskrankheiten



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

# Fuchsräude

(*Sarcoptes scabiei canis*)



Quelle: AJF GR



# Fuchsbandwurm (Echinokokkose)

<b>Allgemeines</b>	Der Fuchsbandwurm ist für den Menschen ein gefährlicher von Wildtieren übertragener Parasit. Ein Befall wird häufig erst nach Jahrzehnten erkannt.
<b>Von einer Ansteckung betroffen</b>	Alle Wildarten. Auch Hund! Endwirt: Fuchs und Hunde; Zwischenwirt: Maus und andere Wildtierarten; Mensch=Fehlwirt.
<b>Übertragung/Verlauf</b>	Der Fuchsbandwurm benötigt zu seiner Entwicklung einen End- und einen Zwischenwirt. Der geschlechtsreife Bandwurm lebt im Darm des Endwirtes und produziert dort winzig kleine Eier, die mit dem Kot ausgeschieden werden. Feh-/Zwischenwirt können sich oral anstecken.
<b>Was kann man dagegen unternehmen?</b>	Beim Abbalgen von Füchsen Hygienemassnahmen (Handschuhe, evt. Atemschutzmaske) einhalten. Hunde und Katzen regelmässig entwurmen. Der Mensch (Jäger) kann sich serologisch (Blut) untersuchen lassen.
<b>Bemerkungen</b>	Krankheitsbezeichnung beim Menschen → Echinokokkose Eine Form von Echinokokkose kann auch die Wildschweine befallen



## Fuchsbandwurm (Echinokokkose)



*E. granulosus* Zysten  
in Wildschweinleber

Dr. Henri Pestieau, DMV




*E. granulosus* Zysten  
in Wildschweinelungen

Dr. Henri Pestieau, DMV



*E. multilocularis* Zysten  
in Wildschweinniere

Dr. Henri Pestieau, DMV



Quelle: Buch «Jagen in der Schweiz»,  
Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz der Schweiz, Abb. 10.2



## Grosser und kleiner Leberegel

<b>Von einer Ansteckung betroffen</b>	Wiederkäuer (z.B. Rinder, Schafe, Schweine) und Hasen.
<b>Übertragung/Verlauf</b>	Es gibt den Grossen und den Kleinen Leberegel. Beide benötigen einen Zwischenwirt, um sich zu entwickeln. In Feuchtgebieten leben die Zwischenwirte (eine Schnecke, Ameise) wo sich Nutz- und Wildtiere anstecken.
<b>Was kann man dagegen unternehmen?</b>	Trockenlegen/Einzäunen von Feuchtgebieten, Entwurmungen (bei Nutztieren). Nur hochgradiger Befall am Tier möglicherweise ersichtlich (struppiges Fell).
<b>Bemerkungen</b>	Beim Aufbrechen/Ausweiden können Verkalkungen auf der Leberoberfläche ersichtlich sein. Eine sichere Diagnose ist beim Anschneiden der Leber (Verdickung der Gallengänge, auspressen von L'egel) zu machen.

## Leberegel, Rundwürmer & Milben



Kleine und Grosse  
Leberegel



grosse Lungenwürmer



Grabmilbe (Räude beim Fuchs)

Quelle: Bilder von  
Franz-Joseph Schawalter,  
Tierarzt i.R., Mosnang

Zecke auf Haut



© 10.20 Hospitalis  
Buchverlag Zürich



# Wildtierkrankheiten: Résumé

- Tierseuche: von Tier zu Tier übertragene Krankheit
- Hoch ansteckende Tierseuche: hohe Gefahr für Wild- und Haustierbestände, wirtschaftliche Schäden
- Zoonosen: Zwischen Mensch und Tier übertragbare Krankheit
- Virale Ansteckungskrankheiten:
  - Schweinepest klassisch (KSP)/ afrikanisch (ASP)
  - Tollwut
  - Vogelgrippe
  - Staupe
- Bakterielle Ansteckungskrankheiten:
  - Lungenentzündung
  - Keratokonjunktivitis (Gamsblindheit)
  - Tuberkulose
  - Actinophytose
- Parasitäre Ansteckungskrankheiten:
  - Räude
  - Fuchsbandwurm (échinococcose)
  - Dasselfliegen



Fédération des chasseurs fribourgeois  
Verband der Freiburger Jäger

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!

